ROSA SULFUREA.

R. (Sulphurea.) germinibus globosis, petiolis cauleque aculeatis: aculeis caulinis duplicibus majoribus minoribusque numerosis; foliolis ovalibus. Arr. Hort. Kew. 2, pag. 201.—Willia. spec. 2, pag. 1065.
—Pers. syn. 3.

R. (Glaucophylla.) Ehrn. Beitr. 2, pag. 69.
Rosier jaune-soufre. D.C. Nouv. Fl. franç. 3695.
Rosier jaune de soufre. Pomer, Enc. 6, pag. 289.

LE ROSIER JAUNE DE SOUFRE.

DESCRIPTION.

La tige de ce Rosier s'élève ordinairement de quatre à six pieds, et souvent à une plus grande hauteur. Elle est armée d'aiguillons nombreux, etroits, subulés, fins, d'inégale longueur, de couleur jaunâtre. Ses feuilles sont ailées à sept folioles ovales, quelquefois arrondies, dentées, d'un vert pâle, et comme glauques en-dessous, à pétioles garnis d'aiguillons avec des stipules découpées. Les fleurs solitaires, inodores, d'un jaune pâle, sont portées par des pédoncules courts et glabres. Les ovaires, globuleux et un peu aplatis à leur sommet, sont souvent glabres, mais quelquefois couverts de poils glanduleux : lobes du calice semi-pinnatifides.

Les principaux Iconographes de la Rose jaune de soufre sont: Clusius, Cur. Post. 6; Besler, Hortus Eyst.; miss Lawrence, et Andrews; elle est encore figurée dans l'Hortus Anglus.

| mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

